



UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

VIRRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

ESCUELA DE POSTGRADO

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN OBSTETRICIA

TRABAJO ACADÉMICO

**RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO CON
REDISTRIBUCIÓN DE FLUJO PLACENTARIO EN PRIMIGESTA
ATENDIDA EN HOSPITAL NIVEL III DE LIMA, 2017**

PRESENTADO POR:

HUAPAYA REYNA, CLORINDA LEONOR

ASESOR

Mgr. ELIZABETH ENI YALÁN LEAL

**PARA OPTAR EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN OBSTETRICIA
CON MENCIÓN EN EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS, ALTO RIESGO Y
CUIDADOS CRÍTICOS MATERNOS**

MOQUEGUA – PERÚ

2017

RESUMEN

La Restricción del Crecimiento Fetal Intrauterino (RCIU) es una importante complicación del embarazo que se asocia con un mayor riesgo de morbimortalidad perinatal y consecuencias a largo plazo en la salud.

La etiología del RCIU es variada y envuelve una diversidad de procesos patológicos por ello radica la importancia de la detección temprana en el control prenatal de estos fetos con alteraciones del crecimiento.

El RCIU se considera una condición multifactorial que abarca aspectos fisiopatológicos fetales, placentarios y maternos, tales como reducción de nutrientes y disponibilidad de oxígeno, ingestión de drogas, disminución de la masa y flujo placentario, infección congénita y anomalías cromosómicas.

Muchos aspectos de esta patología aún no están claros, una proporción significativa de los fetos con crecimiento restrictivo no son identificados antes de nacer, lo que hace difícil aun alcanzar un manejo terapéutico preparto eficaz con la finalidad de prevenir o corregir el déficit de crecimiento.

La identificación temprana de la restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) es fundamental en el intento de reducir la mortalidad y la morbilidad asociada a este problema de ahí la importancia de abordar este tema en el caso clínico a presentar.

Palabras clave: Restricción del Crecimiento Fetal Intrauterino / Embarazo / Redistribución de flujo placentario